

平成29年度 にんじん特裁防除体系

は種後日数		5日	10日	15日	20日	25日	30日	35日	40日	45日	50日	55日	60日	65日	70日	75日	80日	85日	90日	95日	100日	105日	110日																																							
生育期節 農作業	は 種		発 芽					間 引き	始肥 め大 追肥				培 土											収 穫																																						
ネグサレセンチュウ	●																																																													
黒葉枯病																																																														
黒葉枯病・斑点病																																																														
軟腐病 *1																																																														
ハモグリバエ類																																																														
ヨトウムシ *2																																																														
薬剤の使用例	ネ マ ト リ ン エ ー ス 粒 剤																																																													
		15~20kg 1ポイント 1回																																																												
		<table border="1"> <tr> <td>コサイド3000</td> <td>1000倍</td> <td>0ポイント</td> <td>3回まで</td> <td>収穫前使用制限なし</td> </tr> <tr> <td>ポリオキシシンAL水和剤</td> <td>500倍</td> <td>0ポイント</td> <td>3回まで</td> <td>収穫7日前まで</td> </tr> <tr> <td>ストロビーフロアブル</td> <td rowspan="2">2000~3000倍</td> <td rowspan="2">1ポイント</td> <td rowspan="2">1回</td> <td rowspan="2">収穫7日前まで</td> </tr> <tr> <td>黒葉枯病</td> </tr> <tr> <td>斑点病</td> <td>3000倍</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カスミンボルドー</td> <td>1000倍</td> <td>0ポイント</td> <td>2回まで</td> <td>収穫14日前まで</td> </tr> <tr> <td>フローバックDF</td> <td>1000倍</td> <td>0ポイント</td> <td>4回まで</td> <td>収穫前日まで</td> </tr> <tr> <td>スピノエース顆粒水和剤</td> <td>5000倍</td> <td>0ポイント</td> <td>3回まで</td> <td>収穫3日前まで</td> </tr> </table>												コサイド3000	1000倍	0ポイント	3回まで	収穫前使用制限なし	ポリオキシシンAL水和剤	500倍	0ポイント	3回まで	収穫7日前まで	ストロビーフロアブル	2000~3000倍	1ポイント	1回	収穫7日前まで	黒葉枯病	斑点病	3000倍				カスミンボルドー	1000倍	0ポイント	2回まで	収穫14日前まで	フローバックDF	1000倍	0ポイント	4回まで	収穫前日まで	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	0ポイント	3回まで	収穫3日前まで													
コサイド3000	1000倍	0ポイント	3回まで	収穫前使用制限なし																																																										
ポリオキシシンAL水和剤	500倍	0ポイント	3回まで	収穫7日前まで																																																										
ストロビーフロアブル	2000~3000倍	1ポイント	1回	収穫7日前まで																																																										
黒葉枯病																																																														
斑点病	3000倍																																																													
カスミンボルドー	1000倍	0ポイント	2回まで	収穫14日前まで																																																										
フローバックDF	1000倍	0ポイント	4回まで	収穫前日まで																																																										
スピノエース顆粒水和剤	5000倍	0ポイント	3回まで	収穫3日前まで																																																										
除草剤散布	○																																																													
薬剤の使用例	細乳ゴ ー 粒剤ゴ ー 剤又サ Fはン																																																													
		<table border="1"> <tr> <td>ゴーゴーサン細粒剤F</td> <td>4~5kg</td> <td>1ポイント</td> <td rowspan="2">どちらか1回 1ポイント</td> </tr> <tr> <td>ゴーゴーサン乳剤30</td> <td>200~400ml</td> <td>1ポイント</td> </tr> </table>												ゴーゴーサン細粒剤F	4~5kg	1ポイント	どちらか1回 1ポイント	ゴーゴーサン乳剤30	200~400ml	1ポイント																																										
ゴーゴーサン細粒剤F	4~5kg	1ポイント	どちらか1回 1ポイント																																																											
ゴーゴーサン乳剤30	200~400ml	1ポイント																																																												
備考 (耕種的防除) (注意事項)		<p>*1 軟腐病の防除については、作型により防除時期が変わることがあるので、必要に応じて防除を実施する。</p> <p>*2 ヨトウムシ等の鱗翅目害虫が多い場合は必要に応じて防除を実施する。</p> <p>○ 種子消毒 イプロジオン 1P + チウラム 1P 合計2P</p>																																																												