

平成31年度 にんじん特栽培防除体系

は種後日数	5日	10日	15日	20日	25日	30日	35日	40日	45日	50日	55日	60日	65日	70日	75日	80日	85日	90日	95日	100日	105日	110日		
生育期節農作業	は種	発芽					間引き	肥大追肥			培土										収穫			
ネグサレセンチュウ	●																							
黒葉枯病																								
黒葉枯病・斑点病																								
軟腐病 *1																								
ハモグリバエ類																								
ヨトウムシ *2																								
薬剤の使用例	ネマトリンエース粒	15~20kg 1ポイント 1回																						
除草剤散布	○																							
薬剤の使用例	ンゴ乳剤又サ	ゴーゴーサン細粒剤F 4~5kg 1ポイント ゴーゴーサン乳剤 200~400ml 1ポイント } どちらか1回 1ポイント																						
備考 (耕種的防除) (注意事項)	*1 軟腐病の防除については、作型により防除時期が変わることがあるので、必要に応じて防除を実施する。 *2 ヨトウムシ等の鱗翅目害虫が多い場合は必要に応じて防除を実施する。 ○ 種子消毒 イプロジオン 1P + チウラム 1P 合計2P																							

コサイド3000	1,000倍	0ポイント	3回まで	収穫前使用制限なし
ポリオキシシンAL水和剤	500倍	0ポイント	3回まで	収穫7日前まで
ストロビーフロアブル	2,000~3,000倍	1ポイント	1回	収穫7日前まで
黒葉枯病	3,000倍			
カスミンボルドー	1,000倍	0ポイント	2回まで	収穫14日前まで
フローバックDF	1,000倍	0ポイント	4回まで	収穫前日まで
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	0ポイント	3回まで	収穫3日前まで