平成31年度　馬鈴しょ特別栽培防除体系

H31

項目	4月 上	4月 中	4月 下	5月 上	5月 中	5月 下	6月 上	6月 中	6月 下	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下	9月 上	9月 中	9月 下	10月 上	10月 中
作況平年値				始4/29	期5/2	終5/16	5/22		6/11		6/24			8/9		始8/28	期9/10	終9/25		
生育期節 農作業	出庫			植え付け		萌芽期		着蕾		開花			茎葉黄変期	茎葉枯凋期		収穫				
	種子消毒	耕起・整地					中耕	半培	本培土				茎葉処理							
	浴光催芽		除草剤散布																	
	種いも切																			
黒あざ病・そうか病 疫病 軟腐病 アブラムシ類	●								○	●	●	●	●	○						
									○	●	●	●	○							
									○	●	○	○	○							
●は基幹防除 ○は臨機防除 臨機防除は天候の状況や発生状況に応じて散布する 薬剤の使用例	銅モンカスト＋カマッイト			疫病の防除は、ほ場の予察、予察システムの活用で初発後速やかに防除する。 ゾーベック　初回の防除以降10日間隔で！ （グリーンペンコゼブ→7日後にゾーベックエニケード →10日後にランマン→10日後にフロンサイドSC →10日後にランマン）					グリーン 400倍	エゾーベックエニケードク 5000倍 コサイド 1000倍 ゼンターリ 1000倍	ランマン 1500倍 スターナ 1000倍 ゲット 3000倍	フロンサ 1500倍 カスミンボルドー 800倍 ゼンターリ 1000倍	ランマン 1500倍 アグリマイシン 1000倍 ウララDF 4000倍	KBW 400倍						
	モンカット 200倍																			
	銅ストマイ 100倍																			
除草剤散布 植物生長調整剤散布					○									●						
●は基幹防除 ○は臨機防除					センコル 100g									チョッパー処理						

項目	成分P	回数	カウント
モンカット	1P	1回	1P
銅ストマイ	0P	1回	0P
グリーンペンコゼブ	1P	1回	1P
ゾーベックエニケード	1P	1回	1P
ランマン	1P	2回	2P
フロンサイドSC	1P	1回	1P
KBW	0P	1回	0P
コサイド3000	0P	1回	0P
スターナ	1P	1回	1P
カスミンボルドー	0P	1回	0P
アグリマイシン	0P	1回	0P
ゼンターリ	0P	2回	0P
ゲットアウト	1P	1回	1P
ウララDF	1P	1回	1P
センコル	1P	1回	1P
		合計P	10P

備考 （耕種的防除） （注意事項）				
○健全な種芋を使用し、そうか病やウイルス病の発生を抑える。	○ナス科作物以外の作物を4年以上作付けをしていないほ場で栽培する。（輪作体系の確立。）	○未熟有機物の施用をしない。（そうか病や黒あざ病の発生増加につながるため。）	○高pHほ場での作付けは行わない。（そうか病が発生しやすくなるため。）	○排水性の良いほ場で栽培をする。（塊茎腐敗や粉状そうか病の発生を抑えるため。）

※使用基準（使用時期）を遵守し、使用農薬は体系の範囲内の農薬および回数です。（病害虫の発生が無く、薬剤を省略することはかまいません。）

※使用する順番の入れ替えは可能です。